



Phlogenzym[®]

mono

Die pflanzliche Enzymtherapie




Einsatzempfehlung

Pflanzliches Arzneimittel

- Angewendet zur Therapie von akuten Schwellungszuständen nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und der Nebenhöhlen

Dosierung und Einnahme

Wenn vom Therapeuten nicht anders verordnet:
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1 x 1 Tablette täglich, maximal 2 x 1 Tablette täglich.



Für eine optimale Wirkung sollte die Einnahme außerhalb der Mahlzeiten erfolgen, mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach dem Essen.

Dauer der Anwendung

- Bis zum Abklingen der Schwellungen
- Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8–10 Tage

Darreichungsform

Magensaftresistente Tablette



Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe von Phlogenzym[®] mono

Wirkstoff pro Tablette

Bromelain 133–178 mg (800 F.I.P.-E.)

Hilfsstoffe: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat [pflanzlich] (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin.

Gegenanzeigen

- Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff Bromelain, Ananas oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels
- Angeborene oder erworbene Blutgerinnungsstörungen
- Gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen

Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Antibiotika sind die Blut- und Urinspiegel von Antibiotika, z. B. Tetracyklinen, erhöht. Eine Verstärkung der Blutungsneigung bei gleichzeitiger Therapie mit Antikoagulanzen und Thrombozytenaggregationshemmern ist nicht auszuschließen und bedarf ggf. der Kontrolle.

Detailinformationen zu **Phlogenzym® mono**



Nebenwirkungen

Häufig: Magenbeschwerden, Durchfall; allergische Reaktionen, z. B. Hautausschlag oder asthmaähnliche Beschwerden, in diesen Fällen sollte das Arzneimittel unverzüglich abgesetzt werden.

Weitere Hinweise


Keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit / Bedienung von Maschinen.

Keine ausreichenden Untersuchungen bei Schwangeren, Stillenden und Kindern unter 12 Jahren.



Bestellinformationen

VE	Varianten	PZN
20 Stk.	Tabletten	05386317
40 Stk.	Tabletten	05386323
100 Stk.	Tabletten	05386346



Phlogenzym® mono 800 F.I.P.-Einheiten magensaftresistente Tabletten für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Wirkstoff: Bromelain.
Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 magensaftresistente Tablette enthält 133 – 178 mg Bromelain (800 F.I.P.-E.), sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat [pflanzlich] (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. **Anwendungsgebiete:** Akute Schwellungszustände nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und Nebenhöhlen. **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Bromelain, Ananas oder einem der sonstigen Bestandteile. Patienten mit Blutgerinnungsstörungen oder bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen, sollten vor der Einnahme mit ihrem Arzt sprechen. Enthält Lactose. **Nebenwirkungen:** Häufig: Allergische Reaktionen (z. B. Juckten, Rötungen, Schwellungen in Gesicht und Rachen), Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Gelegentlich: Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe und Geruch. Stand 04/2018