

**Liebe Patientin, lieber Patient !**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Gebrauchsinformation****Multi-cyl® L****Ho-Len-Complex®****Lähmungs-Complex****Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 10,7 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Causticum Hahnemanni	Dil. D4	1,5 g
Conium	Dil. D4	2,0 g
Gelsemium	Dil. D6	2,0 g
Plumbum metallicum	Dil. D10	1,5 g
Secale cornutum	Dil. D10	1,5 g
Zincum metallicum	Dil. D12	1,5 g

1g entspricht 23 Tropfen

**Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

**Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Nervensystems.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:****Pharma Liebermann GmbH**

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073)95893-0

Telefax: (09073)95893-55

**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Lähmungen.

Hinweis: Bei Lähmungen sollte die Anwendung des Arzneimittels nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die vom Arzt diesbezüglich verordneten Medikamente. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Gegenanzeigen:**

**Wann dürfen Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex nicht anwenden?**

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

**Wann dürfen Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?**

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zuträfen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Warnhinweis:**

Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex enthält 50,0 Vol.% Alkohol!

**Wechselwirkungen:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex nicht richtig wirken kann!

**Wieviel und wie oft sollten Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Wie und wann sollten Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex anwenden?**

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

**Wie lange sollten Sie Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex anwenden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:**

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Multi-cyl® L Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex auftreten?**

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

**Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Information:** September 2006**Zul.-Nr.:** 6658113.00.00