



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 62 51) 10 97-0 · Fax (0 62 51) 33 42
<http://www.reckeweg.de>

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

GEBRAUCHSINFORMATION

Cyclamen D6, D12, D30, D200

Homöopathisches Arzneimittel hergestellt nach Vorschrift 10 HAB.

Globuli zum Einnehmen; OP mit 10 g Globuli (N1).

Herstellung und Vertrieb:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH · Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51 / 10 97-0 · Fax: 0 62 51 / 33 42 · <http://www.reckeweg.de>

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen medizinischen Rat einholen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Auch die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dosierungsanleitung für D6 und D12:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich 5-10 Globuli einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5-10 Globuli einnehmen.

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als 1/3 der Erwachsenenendosis.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als 2/3 der Erwachsenenendosis.

Dosierungsanleitung für D30 und D200:

Die Dosierung des Arzneimittels sollte individuell nach Empfehlung des behandelnden Therapeuten erfolgen.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur.

Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

Stand der Information: Dezember 1999

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 1525.55.52

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben in der Apotheke ein registriertes homöopathisches Einzelmittel der Firma Dr. Reckeweg & Co. GmbH Bensheim erhalten.

Dr. Reckeweg Bensheim verfügt über eine lange Erfahrung in der Herstellung und Anwendung sowohl homöopathischer Einzelmittel als auch homöopathischer Kombinationsmittel.

Die klassische Homöopathie ordnet ihren ganz individuellen Krankheitssymptomen ein bestimmtes homöopathisches Arzneimittel zu. Bedingt durch die ganzheitliche Betrachtung des Patienten in der Homöopathie, setzt die Mittelauswahl die Erfassung organischer Symptome wie auch der Gemüts- und Geistessymptome voraus. Die Verwendung niedriger Potenzstufen wie D6 und D12 führt dabei zu einer mehr auf das Organ / Organsystem und dessen Funktion bezogenen Wirkung. Die höheren Potenzen wie D30 und D200 erfassen darüber hinaus den geistigen und seelischen Bereich.

Die gesetzlichen Bestimmungen erlauben keine Indikationsangabe (Anwendungsgebiete) bei registrierten homöopathischen Arzneimitteln. Für einige wenige Stoffe sind jedoch in Abhängigkeit von der Potenzstufe Angaben zu Nebenwirkungen und Wechselwirkungen oder zur Dauer der Anwendung zu beachten. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Therapeuten oder Apotheker.

Gute Besserung wünscht Ihnen die Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH Bensheim.