

## MACROGOL 4000 Pulverbeutel



PZN 19288400

### 1. PRODUKT INFORMATIONEN

#### 1.1 Beschreibung

Behandlung der symptomatischen Verstopfung bei Erwachsenen und Kindern ab 8 Jahren

#### 1.2 Produkteigenschaften

- In 50-100 ml Wasser auflösen und trinken
- Kann in jedem Getränk aufgelöst werden, auch heiße Getränke und Suppen
- Wirkt innerhalb von 24-48 Stunden

#### 1.3 Inhaltsstoffe

10g Macrogol 4000 Pulver, enthält keine Aromastoffe oder Hilfsstoffe

#### 1.4 Inhalt

40 Einzeldosisbeutel à 10g

#### 1.5 Gebrauchsanweisung

**Erwachsene:** 1-3 mal täglich 1 Beutel in Wasser gelöst einnehmen.

Als Anfangsdosis können 2 Beutel (20 g Macrogol 4000) für einen schnelleren Wirkungseintritt eingenommen werden. Bei längerer Anwendung wird die Dosis auf 1 Beutel 1-2 mal täglich reduziert.

**Kinder ab 8 Jahren:** 1-2 mal täglich 1 Beutel in Wasser gelöst einnehmen.

Die Tageshöchstmenge darf nicht überschritten werden. Macrogol sollte nicht länger als 28 Tage angewendet werden. Die Anwendung von Macrogol 4000 kann nach einer Pause von 2 Tagen wieder aufgenommen werden

### 1.6 Lagerung

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren  
 Im Originalkarton aufbewahren

---

### 1.7 Anwendung

Schwangere	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksprache mit dem Arzt
Stillende Frauen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksprache mit dem Arzt
Kinder	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	Rücksprache mit dem Arzt
Geeignet ab	8 Jahre							

---

### 1.8 Verantwortliche Firmen

**Vertrieb:** PXG Pharma GmbH, Pfingstweidstraße 10-12, 68199 Mannheim, Germany

**Hersteller:** Fiterman Pharma S.R.L, Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, Romania

---

## 2. Produkthinweise

Macrogol 4000 darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Macrogol, schweren Darmentzündungen ( z.B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn), toxischem Megacolon, Perforation oder Perforationsgefahr, Darmverschluss oder Bauchschmerzen unbekannter Ursache.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Menschen die zu Elektrolytstörungen neigen ( z.B. eingeschränkte Leber- oder Nierenfunktion ), sollten Macrogol 4000 mit Vorsicht anwenden.

Es handelt sich um ein Medizinprodukt.

---